

2025 年度 第 1 回臨床一般部門研修会 ～臨床へ付加価値のある報告の実施を目指そう～
腎機能障害に関する Q&A

愛媛大学医学部附属病院 金並 真吾

設問 1

蛋白尿に関して正しいものを選べ

- ① 尿定性検査での(+)であれば腎機能障害は認められない
- ② 起立性蛋白尿は慢性腎臓病の発症のリスク因子である。
- ③ 尿蛋白定性検査と尿蛋白定量検査では乖離が認められることがある
- ④ Selectivity index が 0.2 以下なら高選択性とされ大分子の蛋白主体となる

設問 2

CKD 患者に対する SGLT2 阻害薬使用時における注意点（副作用）を選べ

- ① 低血糖
- ② 正常血糖ケトアシドーシス
- ③ 急性腎障害（AKI）
- ④ 尿路・性器感染症

設問 3

AKI と判定される病態（検査結果）を選べ

- ① $GFR < 60 \text{ mL/分/1.73 m}^2$ が 3 ヶ月以上続く
- ② 血清クレアチニンが 48 時間以内に 0.3 mg/dL 以上上昇
- ③ 尿量が 0.5 mL/kg/h 未満の状態が 6 時間以上持続する
- ④ 血清クレアチニンが 10 日以内に基礎値から 1.5 倍上昇

設問 4

腎前性 AKI と腎性 AKI を鑑別に有用とされる検査・反応性において、腎前性と判定する結果を選べ

- ① 補液への反応性良好
- ② 多数の尿細管上皮細胞、顆粒円柱
- ③ $FENa > 1\%$
- ④ $FEUN > 35\%$

設問 5

薬剤性腎障害として急性腎障害を起こしうる薬剤を選べ。

- ① シスプラチン
- ② トスフロキサシン結晶
- ③ ベンブロリズマブ
- ④ プロピルチオウラシル